Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant de la Division des produits de soins cutanés de 3M ou avec le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.

N° de référence	Dimensions
91110	Tube de 15 g

Renseignements pour commander :

Hydrogel pour plaies Tegaderm™ 3M™

Atteignez l'équilibre en matière d'environnement humide

Atteignez l'équilibre en matière d'environnement humide

Hydrogel pour plaies **Tegaderm**[MC] **3M**[MC]

Mode d'emploi :

Remarque : Suivre les directives de l'établissement en matière de prévention des infections.

1. Nettoyer la plaie et la peau environnante selon le protocole de soins des plaies défini dans l'établissement.
   Remarque : Si la peau entourant la plaie est fragile ou si elle risque d'être exposée aux exsudats, appliquer le protecteur cutané tel que le protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] 3M[MC]. Laisser sécher le protecteur avant d'appliquer le pansement.

2. Appliquer suffisamment d'hydrogel pour plaies Tegaderm[MC] 3M[MC] pour couvrir la base de la plaie et tout tissu nécrotique sans déborder sur la peau avoisinante. *(Figures 1 e 2).*

Suite au verso

3. Il est également possible de déposer une gaze stérile saturée avec l'hydrogel pour plaies Tegaderm[MC] 3M[MC] à l'intérieur de la plaie en évitant son débordement vers la peau avoisinante.

4. Couvrir avec un pansement secondaire approprié afin de contrôler l'exsudat et de maintenir un environnement humide.

Retrait du pansement :

1. Changer le pansement au besoin. La fréquence des changements dépend de différents facteurs, comme le type de plaie et la quantité d'exsudat.

2. Lors du changement de pansement, rincer la plaie pour éliminer les résidus de gel à l'aide d'un nettoyeur pour plaies ou d'une solution saline stérile.

3. De même, lors du changement de pansement, si le pansement reste collé à la surface de la plaie, le saturer avec une solution saline stérile ou un nettoyeur pour plaies, laisser agir et retirer délicatement le pansement.

4. Éviter de retirer brusquement le pansement afin de minimiser tout risque de lésion supplémentaire.

Contre-indications : Aucune connue.
Mises en garde : Aucune connue.

Précautions :

1. Le traitement d'une plaie doit faire partie d'un protocole de soins prédéfini et être supervisé par un professionnel de la santé.

2. Tout saignement doit être contrôlé avant l'application d'un hydrogel ou d'autres pansements secondaires.

3. Lors de l'utilisation d'un hydrogel ou d'autres pansements, la plaie peut paraître plus large et plus profonde étant donné qu'elle a été débarrassé de ses tissus dévitalisés. Cet agrandissement doit être accompagné d'une amélioration de l'aspect de la plaie. Si la plaie continue de s'agrandir après les premiers changements de pansements, consulter un médecin.

4. Surveiller la plaie pour détecter tout signe d'infection. Consulter un professionnel de la santé dans l'un des cas suivants : fièvre, douleur accrue, rougeur, saignement, œdème, odeur inhabituelle, changement des caractéristiques de l'exsudat (augmentation, turbidité, mauvaise odeur).

5. L'hydrogel pour plaies Tegaderm[MC] 3M[MC] ne doit pas être utilisé sur des plaies infectées sans avis médical préalable.

6. Dans quelques cas isolés, l'utilisation d'un hydrogel ou d'un pansement peut favoriser le développement d'irritation (rougeur), de macération (blanchiment) de la peau environnante, d'hypergranulation (formation excessive de tissu de granulation). Si c'est le cas, consulter un professionnel de la santé.

7. Si la plaie ne montre aucun signe de guérison ou si des symptômes inhabituels apparaissent, consulter un professionnel de la santé.

Pansements
Tegaderm[MC] 3M[MC] SIMPLES. FIABLES. RÉPUTÉS.

3M Health Care
3M Centre, Building 275-4W-02
St. Paul, MN 55144-1000
É.U.

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2009. Tous droits réservés.
3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
0907-06694F